Godkendt juni 2021

Dansk Pædiatrisk Selskab
Danish Paediatric Society

Præmature GA < 32

Svøb i plastik
+ varmelampe

Ilttilskud

GA ≥ 32	21%
GA 28-31	21-30%
GA < 28	30%

Start med 25 cm H_2O

(Dialog med forældrene)
Team briefing og apparatur tjek

Fødsel
Sen afnavling, hvis muligt

Start uret og notér tiden
Aftør og stimulér den nyfødte

Vurdér tonus, vejrtrækning og hjertefrekvens

Hvis ikke normal vejrtrækning:
Skab frie luftveje
Præterm – Overvej CPAP

Hvis gispende eller ingen vejrtrækning:
Giv 5 indblæsninger - 30 cm H_2O (mature)
Start SpO_2-monitorering +/- ECG

Revurdér
Hvis hjertefrekvensen ikke stiger,
Se efter thoraxbevægelser

Hvis der ikke er thoraxbevægelser:
Tjek maske, hoved- og kæbestilling
Overvej 2-personers ventilation
(Sugning/Larynxmaske/Trakealtube)
Overvej højere inspirationstryk
Gentag 5 indblæsninger

Revurdér
Hvis hjertefrekvensen ikke stiger,
Se efter thoraxbevægelser

Hvis der er thoraxbevægelser, fortsæt ventilation

Hvis hjertefrekvensen er (<60 min^{-1})
efter 30 sek. ventilation:
Start hjertemassage: 3 tryk : 1 indblæsning
Giv 100% O_2
Overvej intubation eller larynxmaske

Revurdér
Hjertefrekvens hvert 30 sekund

Hvis fortsat ingen eller meget lav hjertefrekvens
Vaskulær adgang og medicin
Overvej andre faktorer
f.eks.: pneumothorax, hypovolæmi,
kongenitte abnormiteter

Orientér forældrene, debrief teamet
Notér forløbet

Acceptabel
Præ-ductal SpO_2

2 min 65%

5 min 85%

10 min 90%

Omkring 60 sekunder

SØRG FOR NORMAL KROPSTEMPERATUR

OVERVEJ KONSTANT: BEHØVER JEG HJÆLP?

TITRÉR O_2 FOR AT OPNÅ DET ØNSKEDE SATURATIONSNIVEAU